8e CONFÉRENCE EAU & SANTÉ

14 & 15 novembre 2023 - Villeurbanne

graie
PÔLE
EAU & TERRITOIRES

Avec le soutien de

En partenariat avec

IMPACTS DE L'ÉPANDAGE AGRICOLE DE MATIÈRES FERTILISANTES D'ORIGINE RESIDUAIRE (MAFORS) SUR LES VERS DE TERRE (*Eisenia fetida*)

quelques éléments de la bioaccumulation des résidus de
médicaments et biocides lié à l'épandage

Jean-Philippe Bedell ^a, Olivier Roques ^a, Laure Wiest ^b, Rémy Bayard ^c

^a Univ Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, ENTPE, UMR 5023 LEHNA, F-69518, Vaulx-en-Velin, France

^b Univ Lyon, CNRS, Université Claude Bernard Lyon 1, Institut des Sciences Analytiques, UMR 5280, 5 Rue de la Doua, F-69100 Villeurbanne, France

^c INSA Lyon, Laboratoire DEEP EA7429, Université de Lyon, 9 rue de la Physique, 69621, Villeurbanne, France.

RISques liés aux résidus de Médicaments, biocides et
antibiorésistance d'origine humaine et vétérinaire sur les
ressources en EAU du bassin versant de l'Arve

Comment évaluer l'écotoxicité des Mafors dans un contexte d'épandage agricole ?

- Utilisation d'organismes modèles
- Suivis de marqueurs d'effets

Comment évaluer l'écotoxicité des Mafors dans un contexte d'épandage agricole ?

- Utilisation d'organismes modèles
- Suivis de marqueurs d'effets aigus (survie, croissance, comportemental) ou chroniques (reproduction)
- Essai en laboratoire et/ou sur le terrain

Modèle biologique

Modèle biologique

Un modèle biologique idéal

E. fetida (Savigny, 1826)

Eisenia fetida

Surnom : Vers de compost, de fumier

Masse adulte : 0,3 – 0,6 g (8 semaines)

Durée de vie : 2 ans

Localisation : Epigée (20^{er} cm du sol)

- Biologie et physiologie connue
- Sensibilité à divers polluants
- Entrée des polluants par voies passives (contact tégumentaire) et actives (par ingestion)

Modèle biologique

Le ver de fumier *Eisenia fetida*

Groupe fonctionnel : Épigée
Milieu de vie : Matière organique, litière
Reproduction : Hermaphrodite

Avantages :

- ⇒ Cycle de vie rapide, facilement élevé en laboratoire
- ⇒ Utilisé dans les normes internationales ISO
- ⇒ Adapté au contexte de l'étude

Inconvénients :

- Moins sensible que les autres espèces de vers ←
- Moins représentative ←
- Rôle fonctionnel moins important ←

Autre espèce : *Aporrectodea caliginosa* (INRAE Versailles)

Zone d'étude

- Site d'expérimentation du programme RISMEAU
  - Sol agricole avec une activité humaine réduite
  - Représentatif de la zone d'étude
- = Sol de référence

Choix des matrices

- Matrices représentative de la zone d'étude / à l'échelle nationale
- Épanchées sans traitement
- Présences de résidus pharmaceutiques

Boue d'épuration

Fumier de vache

Lisier de vache

- pH élevé pour les effluents agricoles
- Teneur en matières organiques similaires
- Teneur en azote ammoniacale élevé dans le lisier

Approche expérimentale

Approche expérimentale. 1. Tests de toxicité aigües

Roques O. et al. (2023 a)

Approche expérimentale. 1. Tests de toxicité aigües

Test de létalité des vers de terre – NF ISO 11268-1

Tests de toxicité aigües: Résultats

Mafors
■ Boue
● Fumier
▲ Lisier

Effet de létalité observée pour les trois MAFORS
mais à des doses d'amendements différentes
Boue la moins létale (>100 g/kg MS)

Test de létalité des vers de terre – NF ISO 11268-1

Tests de toxicité aigües: Résultats

* Mortalité significative

- Témoin négatif normal car sol « pauvre »
- Effet sur la croissance des trois MAFORS
- Meilleure croissance avec Boue
- Doses les plus fortes avec Boue pour avoir létalité

Tests de toxicité aigües: Conclusions

		Effet (dose agronomique 1 à 2 %)		
		Boue	Fumier	Lisier
Test de germination des plantes	Germination			
	Croissance racinaire	+		
Test de létalité des vers de terre	Survie			
	Croissance	+	+	+
Test d'évitement des vers de terre	Évitement/attraction	+	+	
Microorganismes	Activité enzymatique	+	+	+

Approche expérimentale. 2. Tests de toxicité chroniques

Approche expérimentale. 2. Tests de toxicité chroniques

Test de reproduction des vers de terre – NF ISO 11268-1

Approche expérimentale. 2. Tests de toxicité chroniques

Test de reproduction des vers de terre – NF ISO 11268-1

Tests de toxicité Chroniques: Résultats

Test de reproduction des vers de terre

➤ Augmentation du taux de croissance dans les sols amendés en boue

Approche expérimentale. 2. Tests de toxicité chroniques

➤ Augmentation du taux de croissance dans les sols amendés en boue

➤ Inhibition de la reproduction dans les sols amendés en boue d'épuration et en lisier

* Mortalité significative

Test de reproduction des vers de terre

Tests de toxicité chroniques : Conclusions

		Effets (doses agronomiques)		
		Boue	Fumier	Lisier
Test d'émergence et de croissance des plantes	Germination	++	+	+
	Hauteur des tiges	+	+	
	Masse fraîche des PA	+	+	+
	Masse fraîche des PR	++		
	Masse sèche des PA	++		+
	Masse sèche des PR	+		
Test de reproduction des vers de terre	Croissance	+		
	Reproduction	-		-

Approche expérimentale. 3. Transfert/Bioaccumulation ?

Résultats. 3. Transfert/Bioaccumulation ?

Test de reproduction des vers de terre – Vers de terre

Augmentation du cuivre dans les tissus des vers de terre (Boue)

Résultats. 3. Transfert/Bioaccumulation ?

Test de reproduction des vers de terre – Mesures dans les matrices du test « Sols » et « Sols amendés »

- Résidus pharmaceutiques uniquement détectés et quantifié dans les sols amendés en boue d'épuration
- Seulement 6/33 résidus pharmaceutiques
- Chlorhexidine et dyméthyl-dydécyl-ammonium non quantifié/détecté

Résultats. 3. Transfert/Bioaccumulation ?

Test de reproduction des vers de terre – Vers de terre

- Témoin contaminé
- Molécule différente par rapport à celles quantifiées dans les sols
- Analyses compromises/répétabilité/seuil...
- Gamme de concentration faible

Conclusions

- Tests écotoxicologiques
  - ✓ Effet sur la reproduction (↘ 70 % pour boue et lisier de vache à 20 g.kg⁻¹ d'amendement unique)
  - ✓ Perturbation des réserves énergétiques des vers de terre lors du test de reproduction
  - ✓ Valeurs élevées des activités endocriniennes chez les trois Mafors (test YES/YAS et anti YES et anti-YAS)
- Transfert/bioaccumulation
  - ✓ Transfert potentiel possible résidus médicamenteux
  - ✓ MAIS globalement peu ou pas de bioaccumulation
  - ✓ Bioaccumulation du cuivre dans les vers de terre exposés à la boue

Prospectives/en cours

- État physiologique/réserves des VDT
- BAF ramené à teneur en lipides (VDT) et en C pour Sol et MAFORs
- Lien MO et sa qualité/typologie (bioaccessible versus bioassimilable)
- Identification (voir quantification) des hormones responsables des activités endocriniennes
- Essai test reproduction et bioaccumulation sur les sols des lysimètres

Et donc...

- Doses limites d'épandage proposées à ne pas dépasser: 50 g.kg^{-1} pour le fumier et 10 g.kg^{-1} d'amendement pour la boue et le lisier de vache
- Principaux enseignements:
  - Tests aigues ($\pm$)
  - mais tests chroniques VDT 👍 OUI
- Mesure de la bioaccumulation (technique) encore problématique

Références

- Olivier Roques, Jean-Philippe Bedell, Julia Le Maux, Laure Wiest, Sylvie Nélieu, Christian Mougin, Nathalie Cheviron, Olivier Santini, Vivien Lecomte, Rémy Bayard (2023 a). Assessing the potential ecotoxicological risk of different organic amendments used in agriculture: approach using acute toxicity tests on plants and earthworms. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. DOI: 10.1007/s00244-023-00979-2
- Olivier Roques, Julia Le Maux, Dominique Patureau, Sylvie Nélieu, Isabelle Lamy, Rémy Bayard, Jean-Philippe Bedell (2023 b). Assessing the chronic toxicity of spreading organic amendments on agricultural soil: tests on earthworms and plants. Ecotoxicology and Environmental Safety (<https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2023.115504>)
- J.-P. Bedell, O. Roques, and R. Bayard (2023). From the importance of organic carbon in reproduction tests with *Eisenia fetida*. Environmental Toxicology and Pharmacology (accepted)
- Olivier Roques (2019-2022) : Impact à court et long termes de mélanges de polluants émergents (résidus médicamenteux) et métaux lourds liés aux épandages agricoles sur la faune (et flore) terrestre. Bourse ED Chimie Lyon co-tutelle avec Rémy Bayard (LGCIE-INSA Lyon). Soutenu le 27/01/2023. 267p.

Autres références :

- Claudia Coelho (2017-2019) : Evaluation de la mobilité et du transfert des RFBs dans les plantes et vers de terre de matrices contaminés. Bourse Labex DRIIHM –CNRS. Directeur : Jean-Philippe Bedell (LEHNA-IAPHY, UMR 5023) – thèse soutenue le 30/09/2019 et obtention du diplôme labélisée européen. 265 p.
- Carbonell, G., Pro, J., Gómez, N., Babín, M.M., Fernández, C., Alonso, E., Tarazona, J.V., 2009. Sewage sludge applied to agricultural soil: Ecotoxicological effects on representative soil organisms. Ecotoxicology and Environmental Safety 72, 1309–1319. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2009.01.007>
- Li, D., Hockaday, W.C., Masiello, C.A., Alvarez, P.J.J., 2011. Earthworm avoidance of biochar can be mitigated by wetting. Soil Biology and Biochemistry 43, 1732–1737. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2011.04.019>
- Oleszczuk, P., Hollert, H., 2011. Comparison of sewage sludge toxicity to plants and invertebrates in three different soils. Chemosphere 83, 502–509. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.12.061>
- Parente, C.ET., Oliveira da Silva, E., Sales Júnior, S.F., Hauser-Davis, R.A., Malm, O., Correia, F.V., Saggiaro, E.M., 2021. Fluoroquinolone-contaminated poultry litter strongly affects earthworms as verified through lethal and sub-lethal evaluations. Ecotoxicology and Environmental Safety 207, 111305. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.111305>
- Pivato, A., Raga, R., Vanin, S., Rossi, M., 2014. Assessment of compost quality for its environmentally safe use by means of an ecotoxicological test on a soil organism. Journal of Material Cycles and Waste Management 16, 763–774. <https://doi.org/10.1007/s10163-013-0216-8>
- Žaltauskaitė, J., Vaisiūnaitė, R., Sujetovienė, G., Dagiliūtė, R., 2016. Sewage sludge toxicity: comparison of plants and soil invertebrates response. Desalination and Water Treatment 86, 320–326. <https://doi.org/10.5004/dwt.2017.21392>